

0-6 أشهر

كيفية الحفاظ على سلامة طفلك من الإصابة في المنزل أو على الطريق أو عند اللعب

CHILDSAFETYLINK
Here for you.



أهم المخاوف المتعلقة بسلامة حديثي الولادة إلى سن 6 أشهر هي:

- السقوط من الأسيجة (التخت) أو الأرائك أو طاوولات تغيير الحفاضات
- الاختناق من جراء ابتلاع السوائل أو القطع الصغيرة
- الاختناق في ظروف النوم غير الآمنة
- الحرق بمياه الحمامات الساخنة أو السوائل الساخنة المسكوبة
- التعرض لحادث سيارة
- الغرق

السلامة في المنزل

- وضع الطفل حديث الولادة عند النوم في سرير (تخت) بحواجز أو مهد فارغ بدون مصدات محشوة أو بطانيات ثقيلة أو دمي الحيوانات المحشوة.
- وضع يد واحدة على الأقل على الطفل حديث الولادة عند استخدام طاولة تغيير الحفاضات، أو قومي بتغيير الحفاضات على الأرض.
- وضع يد واحدة على الأقل على الطفل حديث الولادة في جميع الأوقات أثناء الاستحمام.
- التحقق من مياه الاستحمام بباطن ذراعك للتأكد من أنها ليست ساخنة جداً على بشرة طفلك حديث الولادة.
- إضافة أرقام المركز المحلي لمكافحة السموم إلى قائمة جهات الاتصال بهاتفك: 1-844-POISONX (1-844-764-7669)



0-6 أشهر

كيفية الحفاظ على سلامة طفلك من الإصابة في المنزل أو على الطريق أو عند اللعب

CHILDSAFETYLINK
Here for you.



السلامة على الطريق

- استخدام مقعد للسيارة موجّه للخلف دائماً في كل رحلة تتم بسيارة عادية أو نقل أو قان، أو حتى عند ركوب سيارة أجرة.
- ربط جميع أجزاء الحزام وشده.
- تثبيت المقعد بشكل آمن. الشد بقوة بحيث يربط الحزام المقعد في السيارة؛ يجب أن يتحرك أقل من 1 بوصة (2.5 سم).
- إلباس طفلك ملابس ذات طبقات خفيفة وتغطيته ببطانيات بعد أن يتم ربطه بأمان.
- إخراج طفلك حديث الولادة من مقعد السيارة بمجرد وصولك. مقعد السيارة ليس مكاناً آمناً لحديثي الولادة للنوم فيه.

السلامة عند اللعب

- استخدام ألعاب التسنين وتدليك اللثة بلطف بدلاً من الحليّ المخصصة للتسنين.
- اتباع التوصيات المتعلقة بالعمر بشأن الألعاب ومنتجات الأطفال الأخرى.
- مساعدة رضيعك على التعلم والنمو من خلال الاستمتاع بوقت اللعب معاً.
- استخدام مقاعد الأطفال والأراجيح وكراسي الألعاب وغيرها من المفارش الخاصة بممارسة الأنشطة على الأرض.

